

Prospecto

RINOCUSI[®] VITAMINICO

(Retinol acetato)

Composición

Cada 100 gramos de pomada contienen 1.250.000 U.I. de retinol (acetato).

Excipientes: acetato de tocoferol, butilhidroxitolueno, colessterina, vaselina líquida y vaselina filante.

Forma farmacéutica y contenido del envase

Pomada intranasal, envase con 10 gramos.

Actividad

Esta pomada contiene retinol (vitamina A), sustancia que aplicada localmente a nivel de la mucosa nasal, presenta efecto protector de la mucosa nasal irritada.

Titular y fabricante

Titular:

sanofi-aventis, S.A.
C/ Josep Pla, 2
08019 - Barcelona

Fabricante:

sanofi-aventis, S.A.
Avda. de la Industria, 31
28108 Alcobendas (Madrid)

Indicaciones

Alivio sintomático de la irritación de la mucosa nasal en resfriados nasales secos y/o con formación de costras en los orificios nasales.

Contraindicaciones

No utilizar este producto si el paciente tiene alergia conocida a cualquier componente de la fórmula.

Precauciones

No sobrepasar la posología indicada. En caso de que la irritación de la mucosa nasal empeore o si después de 10 días de tratamiento no observa mejoría, deje de utilizar el medicamento y consulte a su médico o farmacéutico.

Interacciones

Aunque no se han descrito interacciones con otros medicamentos, es recomendable evitar la administración conjunta con otros preparados nasales.

Advertencias

Embarazo y lactancia: no son necesarias advertencias especiales.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria: no se han descrito.

Advertencias sobre excipientes: por contener butilhidroxitolueno como excipiente, puede ser irritante de los ojos, piel y mucosas.

Posología

Adultos y niños mayores de 6 años: Aplicar una pequeña cantidad de pomada 2 ó 3 veces al día en el interior de la nariz y/o alrededor de las fosas nasales.

Instrucciones para la correcta administración del preparado

Para uso externo (alrededor de las fosas nasales): Aplicar una fina película sobre la zona afectada, realizando un ligero masaje.

Para uso intranasal: Introducir a fondo la cánula del tubo en la fosa nasal y hacer salir una pequeña cantidad de medicamento. Practicar un ligero masaje para facilitar la distribución de la pomada por toda la mucosa nasal. Una vez aplicada la pomada, ésta debe permanecer en contacto con la zona afectada el mayor tiempo posible, por ello el paciente debe evitar sonarse.

Para aumentar su acción protectora se aconseja aplicar la pomada antes de acostarse.

Sobredosis

Debido a las características de este preparado no son de esperar fenómenos de intoxicación con el uso tópico de la especialidad. En casos de sobredosis o ingestión accidental, acudir a un Centro Médico o consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Reacciones adversas

No se han descrito, pero si observa cualquier reacción adversa atribuible a la aplicación del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

Conservación

Mantener a temperatura ambiente con el envase bien cerrado.

Caducidad

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Texto revisado

Marzo 1996

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

sanofi-aventis, S.A
C/ Josep Pla, 2
08019 - Barcelona